



**Abacavir + Lamivudine Sandoz**  
**KARTA OSTRZEŻEŃ (w opakowaniu z blistrami i butelką)**

**STRONA 1**

**WAŻNE - KARTA OSTRZEŻEŃ**  
**Abacavir + Lamivudine Sandoz, tabletki powlekane**  
*Abacavirum + Lamivudinum*

**Kartę należy mieć zawsze przy sobie.**

Ponieważ Abacavir + Lamivudine Sandoz zawiera abakawir, u niektórych pacjentów przyjmujących ten lek może rozwinąć się reakcja nadwrażliwości (ciężka reakcja uczuleniowa), która może zagrażać życiu w razie dalszego stosowania leku Abacavir + Lamivudine Sandoz.

**NALEŻY NATYCHMIAST SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z LEKARZEM, który doradzi, czy należy przerwać przyjmowanie leku Abacavir + Lamivudine Sandoz, jeśli pacjent ma:**

- 1) wysypkę skórą LUB
- 2) jeden (albo więcej) objawów z co najmniej DWÓCH następujących grup:
  - gorączka,
  - duszność, ból gardła lub kaszel
  - nudności, wymioty, biegunka lub bóle brzucha
  - silne zmęczenie lub obolałość albo złe samopoczucie ogólne

Jeśli stosowanie leku Abacavir + Lamivudine Sandoz zostanie przerwane z powodu tej reakcji, **JUŻ NIGDY NIE WOLNO PRZYJĄĆ** tego leku ani żadnego innego leku zawierającego abakawir (tj. Ziagen, Trizivir lub Triumeq), gdyż w ciągu kilku godzin może wystąpić zagrażające życiu zmniejszenie ciśnienia krwi lub zgon.

(patrz druga strona karty)

**STRONA 2**

W razie podejrzenia wystąpienia reakcji nadwrażliwości na Abacavir + Lamivudine Sandoz, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. Wpisać poniżej dane lekarza prowadzącego:

Lekarz:..... nr telefonu: .....

**Jeżeli lekarz prowadzący nie jest dostępny, należy natychmiast szukać innej pomocy medycznej (tj. oddział pomocy doraźnej najbliższego szpitala).**

W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących leku Abacavir + Lamivudine Sandoz, należy skontaktować się z: Sandoz Polska Sp. z o.o., ul. Domaniewska 50 C, 02-672 Warszawa, tel. 22 209 70 00

