

KARTA OSTRZEŻEŃ DLA PACJENTA

((Przód))		((Tył))	
	Istotne ostrzeżenia dla pacjentów przyjmujących lek Bosentan Sandoz GmbH		Antykoncepcja
Karta ostrzeżeń zawiera ważne informacje na temat leku Bosentan Sandoz GmbH. Należy przeczytać je uważnie przed rozpoczęciem stosowania tego leku.		Czy obecnie stosuje Pani środki antykoncepcyjne? <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie	
Imię i nazwisko: _____ Lekarz prowadzący: _____ W przypadku pytań dotyczących stosowania leku Bosentan Sandoz GmbH, należy zwrócić się do lekarza prowadzącego.		Jeśli tak, proszę podać ich nazwy: _____ _____	
((Str. 1))		((Str. 2))	
Niniejszą stronę powinny uważnie przeczytać kobiety w wieku rozrodczym.		Badania krwi w celu skontrolowania czynności wątroby	
Ciąża		U niektórych pacjentów przyjmujących lek Bosentan Sandoz GmbH mogą wystąpić nieprawidłowe wyniki badań czynności wątroby. W czasie stosowania leku Bosentan Sandoz GmbH lekarz zleci regularne badania krwi w celu kontrolowania zmian czynności wątroby.	
Lek Bosentan Sandoz GmbH może niekorzystnie wpłynąć na rozwój płodu. Dlatego nie wolno stosować leku Bosentan Sandoz GmbH w czasie ciąży i nie wolno <u>zajść</u> w ciążę podczas stosowania leku Bosentan Sandoz GmbH.		Należy pamiętać o wykonywaniu co miesiąc badań krwi w celu skontrolowania czynności wątroby. Po zwiększeniu dawki dodatkowe badanie należy wykonać po 2 tygodniach.	
Ponadto u pacjentki z tętniczym nadciśnieniem płucnym ciąża może znacząco nasilić objawy choroby. W przypadku podejrzenia ciąży należy powiadomić o tym swojego lekarza prowadzącego lub lekarza ginekologa.		Data pierwszego comiesięcznego badania: _____	
Antykoncepcja		Plan comiesięcznych badań krwi kontrolujących czynności wątroby:	
Antykoncepcja z zastosowaniem środków hormonalnych, takich jak doustne środki antykoncepcyjne (tabletki antykoncepcyjne), hormony podawane we wstrzyknięciu, implantry lub antykoncepcyjne systemy transdermalne (plastry), nie zapewnia skutecznej ochrony przed ciążą u kobiet stosujących lek Bosentan Sandoz GmbH. Oprócz każdej z wymienionych metod hormonalnych należy dodatkowo stosować barierową metodę zapobiegania ciąży, taką jak prezerwatywa, diafragma (błona) dopochwowa lub gąbka dopochwowa. Wszelkie wątpliwości należy omówić z lekarzem prowadzącym lub ginekologiem. Należy wypełnić informacje na drugiej stronie tej Karty i przekazać swojemu lekarzowi lub ginekologowi podczas następnej wizyty.		<input type="checkbox"/> styczeń <input type="checkbox"/> maj <input type="checkbox"/> wrzesień <input type="checkbox"/> luty <input type="checkbox"/> czerwiec <input type="checkbox"/> październik <input type="checkbox"/> kwiecień <input type="checkbox"/> sierpień <input type="checkbox"/> grudzień	

KARTA OSTRZEŻEŃ DLA PACJENTA

Przed rozpoczęciem stosowania leku Bosentan Sandoz GmbH, a następnie co miesiąc podczas leczenia należy wykonać test ciążowy, nawet jeśli pacjentka uważa, że nie jest w ciąży.

Data pierwszego comiesięcznego badania: _____