

METHOTREXAT-EBEWE

KARTA OSTRZEGAWCZA PRZEZNACZONA JEST WYŁĄCZNIE DLA PACJENTÓW, KTÓRZY STOSUJĄ LEK ZAWIERAJĄCY METOTREKSAT W LECZENIU NAJCIEŹSZEJ, OPORNEJ NA LECZENIE POSTACI UOGÓLNIONEJ ŁUSZCZYCY POSPOLITEJ (*PSORIASIS VULGARIS*), WŁĄCZNIE Z ŁUSZCZYCOWYM ZAPALENIEM STAWÓW (ŁUSZCZYCA STAWOWA) ORAZ CHORÓB AUTOIMMUNOLOGICZNYCH, NP. REUMATOIDALNEGO ZAPALENIA STAWÓW.

JEŚLI METOTREKSAT JEST STOSOWANY W JEDNYM Z POWYŻSZYCH WSKAZAŃ, NALEŻY GO PRZYJMOWAĆ WYŁĄCZNIE RAZ W TYGODNIU.

Wpisać pełną nazwę dnia tygodnia, w którym należy przyjmować lek: _____

Nie przyjmować większej dawki niż dawka przepisana.

Przedawkowanie może spowodować ciężkie działania niepożądane, w tym zgon. Do objawów przedawkowania należą, między innymi, ból gardła, gorączka, owrzodzenie jamy ustnej, biegunka, wymioty, wysypki skórne, krwawienie i nietypowe osłabienie.

W przypadku podejrzenia, że przyjęta została dawka większa niż przepisana, należy natychmiast zasięgnąć porady lekarskiej.

Tę kartę należy zawsze pokazywać pracownikom służby zdrowia, którzy nie wiedzą, według jakiego schematu pacjent jest leczony metotreksatem (np. przy przyjęciu do szpitala, zmianie opieki), aby poinformować ich o dawkowaniu raz na tydzień.

Dalsze informacje znajdują się w dołączonej do opakowania ulotce dla pacjenta.