

**Abacavir + Lamivudine Sandoz
KARTA OSTRZEŻEŃ**

STRONA 1

WAŻNE - KARTA OSTRZEŻEŃ

Leki zawierające abakawir

Kartę należy mieć zawsze przy sobie.

Ponieważ Abacavir + Lamivudine Sandoz zawiera abakawir, u niektórych pacjentów przyjmujących ten lek może rozwinąć się reakcja nadwrażliwości (ciężka reakcja uczuleniowa), która może zagrażać życiu w razie dalszego stosowania leku Abacavir + Lamivudine Sandoz.

NALEŻY NATYCHMIAST SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z LEKARZEM, który doradzi, czy należy przerwać przyjmowanie leku Abacavir + Lamivudine Sandoz, jeśli pacjent ma:

- 1) wysypkę skórą **LUB**
- 2) jeden (albo więcej) objawów z co najmniej **DWÓCH** następujących grup:
 - **gorączka,**
 - **duszność, ból gardła lub kaszel**
 - **nudności, wymioty, biegunka lub bóle brzucha**
 - **silne zmęczenie lub obolałość albo złe samopoczucie ogólne**

Jeśli stosowanie leku Abacavir + Lamivudine Sandoz zostanie przerwane z powodu tej reakcji, **JUŻ NIGDY NIE WOLNO PRZYJĄĆ** żadnego leku zawierającego abakawir, gdyż w ciągu kilku godzin może wystąpić zagrażające życiu zmniejszenie ciśnienia krwi lub zgon.

(patrz druga strona karty)

STRONA 2

W razie podejrzenia wystąpienia reakcji nadwrażliwości na Abacavir + Lamivudine Sandoz, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. Wpisać poniżej dane lekarza prowadzącego:

Lekarz:..... nr telefonu:

Jeżeli lekarz prowadzący nie jest dostępny, należy natychmiast szukać innej pomocy medycznej (tj. oddział pomocy doraźnej najbliższego szpitala).