

Agodeprin

Przewodnik dla pacjenta

ZALECENIA W CELU UNIKNIĘCIA WPŁYWU DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH NA WĄTROBE
Agomelatyna może powodować działania niepożądane, w tym zmiany czynności wątroby. Niniejszy przewodnik zawiera zalecenia dotyczące postępowania w celu uniknięcia niepożądanego wpływu na wątrobę oraz porady, co robić w przypadku ich wystąpienia podczas przyjmowania leku Agodeprin.

Należy zwrócić się do lekarza w celu uzyskania dalszych informacji

Agodeprin jest lekiem przeciwdepresyjnym, który pomaga w leczeniu depresji.

W celu uzyskania najlepszych wyników leczenia należy przestrzegać zaleceń lekarza dotyczących przyjmowania leku (dawka, czas trwania leczenia, wizyty kontrolne u lekarza oraz badania krwi).

Co robić przed rozpoczęciem przyjmowania leku Agodeprin

- Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli u pacjenta stwierdzono nieprawidłową czynność wątroby. W takim przypadku nie należy stosować leku Agodeprin.
- Stosowanie leku Agodeprin może być niewskazane również z innych przyczyn. Należy poradzić się lekarza, jeśli pacjent:
 - miał kiedykolwiek zaburzenia czynności wątroby
 - jest otyły lub ma nadwagę
 - choruje na cukrzycę
 - nadużywa alkoholu
 - przyjmuje inne leki (o niektórych z nich wiadomo, że wpływają na czynność wątroby)

Co robić, aby uniknąć problemów z wątrobą w trakcie leczenia

➤ Należy regularnie wykonywać badania krwi

• Dlaczego?

Przed rozpoczęciem leczenia lekarz skontroluje, czy czynność wątroby pacjenta jest prawidłowa. Wyniki zleconych badań krwi wskażą lekarzowi, jak pracuje wątroba pacjenta i pomogą ustalić, czy Agodeprin jest dla niego odpowiednim lekiem.

U niektórych pacjentów możliwe jest zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych w trakcie stosowania leku Agodeprin. Aktywności tych enzymów wskazują na prawidłową lub nieprawidłową czynność wątroby i mają kluczowe znaczenie dla lekarza kontrolującego przebieg leczenia u pacjenta.

• Kiedy?

	Przed rozpoczęciem leczenia lub przed zwiększeniem dawki	Okolo 3 tygodni	Okolo 6 tygodni	Okolo 3 miesięcy	Okolo 6 miesięcy
Badanie krwi	✓	✓	✓	✓	✓

Jeśli lekarz zwiększy dawkę do 50 mg, należy powtórnie wykonywać badania krwi.

Należy pamiętać, aby na wizyty u lekarza przynosić ze sobą TERMINARZ BADAŃ KRWI (patrz następna strona).

Jeśli pacjent uzyska jakąkolwiek informację o zwiększeniu aktywności enzymów wątrobowych we krwi w trakcie leczenia, należy niezwłocznie powiadomić o tym lekarza.

➤ **Należy zwrócić uwagę na objawy zaburzeń czynności wątroby**

Wystąpienie któregokolwiek z poniższych objawów może wskazywać na nieprawidłową czynność wątroby:

- żółte zabarwienie skóry i (lub) oczu
- ciemne zabarwienie moczu
- jasne zabarwienie stolca
- ból w prawej górnej części brzucha
- nietypowe zmęczenie (zwłaszcza w połączeniu z innymi, wymienionymi wyżej objawami niewyjaśnionego zmęczenia)

W opisanych przypadkach należy pilnie zwrócić się do lekarza, który może zalecić przerwanie przyjmowania leku Agodeprin.

TERMINARZ BADAŃ KRWI

PRZYPOMNIENIE

Podczas przyjmowania leku Agodeprin ważne jest regularne wykonywanie badań krwi.

PONIŻSZA TABELA MA NA CELU UŁATWIENIE PACJENTOWI ZAPAMIĘTANIA TERMINARZA KONTROLNYCH BADAŃ KRWI

Agodeprin w dawce 25 mg - data pierwszego przyjęcia	
Odstęp między kolejnymi badaniami enzymów wątrobowych we krwi	Data
Pierwsze badanie (<i>na początku leczenia</i>)	
Drugie badanie (<i>po około 3 tygodniach</i>)	
Trzecie badanie (<i>po około 6 tygodniach</i>)	
Czwarte badanie (<i>po około 3 miesiącach</i>)	
Piąte badanie (<i>po około 6 miesiącach</i>)	

Lekarz może zalecić wykonywanie dalszych badań krwi.

Zwiększenie dawki do 50 mg - data pierwszego przyjęcia	
Odstęp między kolejnymi badaniami enzymów wątrobowych we krwi	Data
Pierwsze badanie na początku stosowania dawki 50 mg	
Drugie badanie (<i>po około 3 tygodniach</i>)	
Trzecie badanie (<i>po około 6 tygodniach</i>)	
Czwarte badanie (<i>po około 3 miesiącach</i>)	
Piąte badanie (<i>po około 6 miesiącach</i>)	

Lekarz może zalecić wykonywanie dalszych badań krwi.

Lekarz będzie kontrolował wyniki badań krwi wykonywane zgodnie z ustalonym schematem monitorowania czynności wątroby. Należy pamiętać o zabraniu ze sobą niniejszego przewodnika na wizytę u lekarza.