

Karta ostrzegawcza dla pacjenta

Karta ostrzegawcza dla pacjenta zawiera istotne informacje związane z bezpieczeństwem, które należy brać pod uwagę przed zastosowaniem leku Erelzi oraz w trakcie terapii tym lekiem. Jeśli informacje zawarte w Karcie budzą wątpliwości, należy omówić je z lekarzem.

- Kartę należy pokazać każdemu lekarzowi uczestniczącemu w leczeniu pacjenta.
- W celu uzyskania dalszych informacji należy zapoznać się z treścią ulotki dla pacjenta.
- Kartę ostrzegawczą należy mieć przy sobie przez 2 miesiące po przyjęciu ostatniej dawki leku Erelzi, gdyż działania niepożądane mogą wystąpić nawet po przyjęciu ostatniej dawki leku.

Zakażenia

Lek Erelzi może zwiększyć ryzyko zakażeń, które mogą mieć ciężki przebieg.

- Leku Erelzi nie należy stosować, jeśli pacjent ma jakiegokolwiek zakażenie. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem.
- Jeśli u pacjenta wystąpią objawy wskazujące na zakażenie takie jak gorączka, uporczywy kaszel, zmniejszenie masy ciała lub ospałość, należy natychmiast poinformować o tym lekarza.
- Lekarz wykona badania w celu oceny, czy u pacjenta nie występują objawy gruźlicy. Należy poprosić lekarza o odnotowanie poniżej daty wykonania ostatniego badania oraz wyników:

Badanie: _____

Data: _____

Wyniki: _____

Badanie: _____

Data: _____

Wyniki: _____

Należy poprosić lekarza o wymienienie poniżej wszystkich przyjmowanych przez pacjenta leków, które mogą zwiększyć ryzyko zakażenia.

Zastoinowa niewydolność serca

Jeśli u pacjenta wystąpią objawy wskazujące na wystąpienie zastoinowej niewydolności serca lub nasilenia istniejącej zastoinowej niewydolności serca takie jak duszność, obrzęk w okolicy kostek, uporczywy kaszel lub uczucie zmęczenia, należy niezwłocznie zwrócić się o pomoc medyczną.

Inne informacje (należy wypełnić):

Imię i nazwisko pacjenta _____

Imię i nazwisko lekarza _____

Nr telefonu lekarza _____

Bardzo istotne jest zapisanie nazwy i numeru serii stosowanego leku.

Nazwa leku: _____

Nr serii: _____