

Karta ostrzegawcza dla lekarzy: prawidłowa droga podania leku w leczeniu chłoniaków nieziarniczych (NHL) i przewlekłej białaczki limfocytowej (PBL)

Riximyo®

Lek Riximyo jest przeznaczony **WYŁĄCZNIE do podawania DOŻYLNEGO**
NIE PODAWAĆ PODSKÓRNICIE

W obrocie dostępne są inne produkty lecznicze zawierające rytuksymab do podawania podskórnego.

PODANIE W INFUZJI DOŻYLNEJ

Riximyo 100 mg koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji
Riximyo 500 mg koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji
Do podawania dożylnego we wszystkich zatwierdzonych wskazaniach

Riximyo® 100 mg

koncentrat do sporządzania
roztworu do infuzji

Rituximabum

100 mg/10 ml

Do podawania dożylnego
po rozcieńczeniu.

2 fiołki po 10 ml

SANDOZ A Novartis
Division

Riximyo® 500 mg

koncentrat do sporządzania
roztworu do infuzji

Rituximabum

500 mg/50 ml

Do podawania dożylnego
po rozcieńczeniu.

1 fiołka 50 ml

SANDOZ A Novartis
Division

Rozcieńczyć 0,9% roztworem NaCl lub 5% roztworem glukozy i podawać w infuzji dożylniej.

Data zatwierdzenia materiału przez URPL: 10/2019
PL1910758610