

ERELZI® – KARTA OSTRZEGAWCZA DLA PACJENTA

Imię i nazwisko pacjenta: _____

Imię i nazwisko lekarza: _____

Numer telefonu lekarza: _____

Karta ostrzegawcza dla pacjenta zawiera istotne informacje związane z bezpieczeństwem, które należy brać pod uwagę przed zastosowaniem leku Erelzi® oraz w trakcie terapii tym lekiem. Jeśli informacje zawarte w Karcie budzą wątpliwości, należy omówić je z lekarzem.

- Kartę należy pokazać każdemu lekarzowi uczestniczącemu w leczeniu pacjenta.
- W celu uzyskania dalszych informacji należy zapoznać się z treścią ulotki dla pacjenta.

Stosowanie u dzieci i młodzieży (o masie ciała poniżej 62,5 kg)

Leku Erelzi® nie należy stosować u dzieci i młodzieży o masie ciała poniżej 62,5 kg. W razie jakichkolwiek wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem.

Zakażenia

Lek Erelzi® może zwiększyć ryzyko zakażeń, które mogą mieć ciężki przebieg.

- Leku Erelzi® nie należy stosować, jeśli pacjent ma jakiegokolwiek zakażenie. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem.
- Jeśli u pacjenta wystąpią objawy wskazujące na zakażenie (takie jak gorączka, uporczywy kaszel, zmniejszenie masy ciała lub ospałość), należy natychmiast poinformować o tym lekarza.
- Lekarz wykona badania w celu oceny, czy u pacjenta nie występują objawy gruźlicy. Należy poprosić lekarza o odnotowanie poniżej daty wykonania ostatniego badania oraz wyników.

Badanie: _____

Data: __/__/----

Wynik: _____

Badanie: _____

Data: __/__/----

Wynik: _____

Należy poprosić lekarza o wymienienie poniżej wszystkich przyjmowanych przez pacjenta leków, które mogą zwiększyć ryzyko zakażenia.

Zastoinowa niewydolność serca

Jeśli u pacjenta wystąpią objawy **wskazujące na zastoinową niewydolność serca lub nasilenie istniejącej zastoinowej niewydolności serca** (takie jak duszność, obrzęk w okolicy kostek, uporczywy kaszel lub uczucie zmęczenia), należy niezwłocznie zwrócić się o pomoc medyczną.

Podczas stosowania leku Erelzi® i przez 2 miesiące po przyjęciu ostatniej jego dawki należy zawsze mieć przy sobie kartę ostrzegawczą, gdyż działania niepożądane mogą wystąpić nawet po zakończeniu stosowania leku Erelzi®.

Bardzo istotne jest zapisanie nazwy i numeru serii stosowanego leku.
