

Instrukcja prawidłowego stosowania leku Nasometin Control za pomocą aplikatora.

Szczegóły prawidłowego stosowania aplikatora znajdują się w ulotce dołączonej do opakowania. Należy zapoznać się z nimi przed użyciem leku.

Jak stosować aerozol do nosa

1. Mocno wstrząsnąć butelkę i zdjąć wieczko ochronne.
2. Przed aplikacją leku należy udrożnić nos w celu ułatwienia dotarcia leku do miejsca działania. Delikatnie wydmuchać nos, aby oczyścić przewody nosowe.
3. Zamknąć jeden otwór nosowy i włożyć końcówkę dozownika do drugiego otworu nosowego. Pochylić głowę lekko do przodu, trzymając butelkę pionowo do góry.
4. Nacisnąć palcami dozownik **JEDEN RAZ**, aby rozpylić w nosie drobną mgiełkę aerozolu i jednocześnie rozpocząć delikatny i powolny wdech przez nos.

Nie aplikować bezpośrednio na przegrodę nosową.

Końcówka aplikatora powinna być skierowana na boczną ścianę nosa (nie powinna dotykać przegrody nosa, która znajduje się w linii środkowej nosa).

UWAGA!

Utrzymywanie butelki w pozycji pionowej jest bardzo ważne, ponieważ niewłaściwe rozpylenie może spowodować uszkodzenie przegrody nosowej (rysunek 1).



Rysunek 1

5. Wykonać wydech przez usta. Następnie powtórzyć czynności opisane w punkcie 4, aby podać drugą dawkę aerozolu do tego samego otworu nosowego (jeśli takie jest zalecane dawkowanie).
6. Wyjąć końcówkę dozownika z otworu nosowego i wykonać wydech przez usta. Powtórzyć czynności opisane w punktach 3 do 6, aby podać aerozol do drugiego otworu nosowego.

Po użyciu aerozolu należy ostrożnie wytrzeć końcówkę dozownika czystą chusteczką lub ściereczką i założyć wieczko ochronne.



NASOMETIN[®]
CONTROL

NASC/004/10-2019

SANDOZ A Novartis
Division